

NOME: COGNOME: MATR.

--	--	--	--	--	--

Attenzione: risolvere i seguenti esercizi con l'ausilio di Matlab. Per ciascun esercizio riportare sul retro del foglio i comandi Matlab utilizzati. Per accedere alle funzioni Matlab richieste eseguire in Matlab il comando `addpath('M:\MATLAB\Toolbox\Parolini')`.

Esercizio 1. Si consideri la funzione $y(x) = e^{\sin(x)} - \cos(\pi)e^x$

- a. Calcolare un'approssimazione della derivata prima nel punto $x = 0$ utilizzando la formula delle differenze finite centrate con diversi valori del passo di discretizzazione spaziale $h = 0.05, 0.025, 0.0125$.

- b. Calcolare un'approssimazione della derivata seconda nel punto $x = 0$ utilizzando la formula delle differenze finite centrate con diversi valori del passo di discretizzazione spaziale $h = 0.05, 0.025, 0.0125$.

- c. Dopo aver calcolato il valore esatto della derivata prima in $x = 0$, si utilizzino i risultati ottenuti nel punto a. per stimare numericamente l'ordine di accuratezza della formula delle differenze finite centrate.

Esercizio 2. Si vuole interpolare la funzione $y(x) = e^{\cos(x)} + \sin(\pi)e^x$ nei punti di ascissa $x = 0, 1/3, 3/4, 1$.

- a. Si determini il polinomio caratteristico di Lagrange relativo al secondo nodo ($x = 1/3$) .

- b. Utilizzando le funzioni `polyfit` e `polyval`, si calcoli l'interpolante lagrangiana della funzione nei nodi assegnati e si riporti l'equazione del polinomio così ottenuto.

- c. Si calcoli il valore dell'interpolante nel punto $x = 1/2$ e l'errore rispetto al valore esatto della soluzione nello stesso punto e si fornisca una stima teorica dell'errore di interpolazione. .

Esercizio 3. Si consideri il seguente problema parabolico (equazione del calore)

$$\begin{cases} u_t - 0.1u_{xx} = \cos(x) & \text{per } (x, t) \in (0, 1) \times (0, 1], \\ u(0, t) = u(1, t) = 1 & \text{per } t \in (0, 1], \\ u(x, 0) = 1 + \sin(\pi x) & \text{per } x \in [0, 1], \end{cases}$$

- a. Con l'ausilio della funzione `thetam.m`, si calcoli la soluzione approssimata del problema all'istante $t = 1$ mediante il metodo di Eulero esplicito utilizzando un passo di discretizzazione spaziale $h = 1/20$ e un passo temporale $dt = 1/50$. Si riporti il valore della soluzione approssimata al centro del dominio ($x = 0.5$) agli istanti $t = 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1$.

.....

- b. Si ripeta il punto precedente dimezzando il passo temporale (ovvero prendendo $dt = 1/100$) e si commenti il risultato.

.....

- c. Utilizzando la condizione di stabilità per il metodo di Eulero esplicito, si calcoli la dimensione massima del passo temporale tale per cui la soluzione del problema con $h = 1/20$ risulti stabile.

.....

Esercizio 4. Si consideri il sistema lineare $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, dove A è la matrice di ordine otto generata dal comando Matlab `A = gallery('parter', 8);`.

- a. Costruire il vettore \mathbf{b} supponendo che la soluzione sia il vettore $\mathbf{x} = [0, 1, 0, -1, 0, -1, 0, 1]^T$.
 Riportare il vettore \mathbf{b} in `format short`.

.....

- b. Calcolare la matrice di iterazione B_J del metodo di Jacobi e la matrice di iterazione B_{GS} del metodo di Gauss-Seidel. Calcolare e riportare i rispettivi raggi spettrali. Commentare il risultato rispetto alla convergenza dei due metodi iterativi

.....

- c. Sulla base dei risultati ottenuti, scegliere uno dei due metodi (funzioni `jacobi.m` e `gs.m`) per calcolare un'approssimazione della soluzione del sistema utilizzando una tolleranza di 10^{-5} e partendo dal vettore iniziale nullo. Calcolare l'errore in norma infinito rispetto alla soluzione esatta e riportarlo in `format long`.

.....

