

NOME: COGNOME: MATR.

--	--	--	--	--	--

Attenzione: risolvere i seguenti esercizi con l'ausilio di Matlab. Per ciascun esercizio riportare sul retro del foglio i comandi Matlab utilizzati. Per accedere alle funzioni Matlab richieste eseguire in Matlab il comando `addpath('M:\MATLAB\Toolbox\Parolini')`.

Esercizio 1. Si consideri la funzione $f(x) = \begin{cases} \sin(x), & \text{per } x < 0, \\ \cos(x), & \text{per } x > 0. \end{cases}$

- a. Si approssimi l'integrale $I = \int_{-2}^2 f(x) dx$ utilizzando la formula di Simpson composta (funzione `simpcomp.m`) su 4 sottointervalli e si riporti la soluzione in **format short**.

- b. Si ripeta il punto precedente utilizzando ora 8 sottointervalli e si riporti la soluzione in **format short**.

- c. Si calcoli il valore esatto dell'integrale I , si valuti l'errore per le due approssimazioni e si commenti il risultato.

Esercizio 2. Si vuole interpolare la funzione $y(x) = e^{-12x^2}$ in 8 punti equispaziati sull'intervallo $[-1, 1]$.

- a. Utilizzando le funzioni `polyfit` e `polyval`, si calcoli l'interpolante lagrangiana della funzione nei nodi assegnati e si fornisca il coefficiente del termine di grado 2 del polinomio interpolante e il valore dell'interpolante nel punto $x = 9/10$

- b. Si interpoli la stessa funzione sugli stessi nodi utilizzando ora una spline naturale cubica (funzione `spline_nat.m`) e si fornisca il valore della spline nel punto $x = 9/10$

- c. Si discutano le proprietà di convergenza delle due interpolazioni considerate all'aumentare del numero di nodi N e si discutano i risultati ottenuti

Esercizio 3. Si consideri il seguente problema parabolico (equazione del calore)

$$\begin{cases} u_t - 0.1u_{xx} = 0, & \text{per } (x, t) \in (0, 1) \times (0, 1], \\ u(0, t) = u(1, t) = 0, & \text{per } t \in (0, 1], \\ u(x, 0) = f(x), & \text{per } (x, t) \in (0, 1) \end{cases} \quad \text{dove } f(x) = \begin{cases} 2x, & 0 \leq x < 1/2 \\ 1, & 1/2 \leq x \leq 3/4 \\ 4 - 4x, & 3/4 < x \leq 1 \end{cases}$$

- Con l'ausilio della funzione `thetam.m`, si calcoli la soluzione approssimata del problema all'istante $t = 1$ mediante il metodo di Eulero esplicito utilizzando un passo di discretizzazione spaziale $h = 1/20$ e un passo temporale $dt = 1/50$. Si riporti sul retro del foglio il grafico della soluzione agli istanti $t = 0, 0.5, 1$ e il valore della soluzione approssimata al centro del dominio ($x = 0.5$) agli stessi istanti.
- Si ripeta il punto precedente dimezzando il passo temporale (ovvero prendendo $dt = 1/100$) e si commenti il risultato.
- Utilizzando la condizione di stabilità per il metodo di Eulero esplicito, si calcoli la dimensione massima del passo temporale tale per cui la soluzione del problema con $h = 1/20$ risulti stabile.

Esercizio 4. Si consideri il sistema lineare $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, dove A è la matrice di ordine otto generata dai comandi Matlab `A = gallery('parter', 8); A=A'*A;`

- Costruire il vettore \mathbf{b} supponendo che la soluzione sia il vettore $\mathbf{x} = [0, 1, 0, -1, 0, -1, 0, 1]^T$. Riportare il vettore \mathbf{b} in `format short`.
- Calcolare la soluzione del sistema lineare utilizzando il metodo del gradiente (funzione `graddyn.m`) con una tolleranza di 10^{-5} e partendo dal vettore iniziale nullo. Riportare l'errore in norma infinito e il numero di iterazioni richieste.
- Calcolare la soluzione del sistema lineare utilizzando il metodo del gradiente coniugato (funzione `gradconj.m`) con una tolleranza di 10^{-5} e partendo dal vettore iniziale nullo. Riportare l'errore in norma infinito e il numero di iterazioni richieste.
- Commentare i risultati ottenuti.